Roussaïtis noir

Vass4R13s566-570



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp992

Roustaitis Noir 4 R 13 s. 566.570







N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

Roussaitis non 4 R 131-566,5701.2

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

-Calvo 96

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

Juntimilanita

Roussaitis noir 4 R 13 s- 566.570 s-5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtele. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 243 - à raies 249 - vert 250. ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253. dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259. : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes. très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264) - vert 265. Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : male 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 96

Roussaitis noir 4R13s.566.570s.3

N° d'ordre : Désignation : Emplacement ;

landmalanta

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

<u>limbe</u>: glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.

partiellement - totalement.

Calve 96

N° d'brite : Designation : Emplacement :

luntimilanta

Roussaitis moir 4 R13.A. 566. 570 s. 2

GRAPPE

Grosse 68 - Movenne 19 - Porter 70 (dimensions 16x). Lacks 71 - Moyenne 72 - Compacts (3) A pedoneule non visible 74 - visible (5) long Chapis A padentule herbace 77 - mi-achte 78 - achte jusqu'à la première ramification 79. Axe de la ratio colore 80 - ma tolore 81.

Très grosse 82 - Grosse 88 - Moderte 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions : 19 x 18). De couleur blanc 87 - gris 88 rose 89 - rouge on - noir 91. Tres pruince (2)- pruince 93 non pruince 94. Coloration regulière - irregulyare. Forme : discorde 95 - spheroide 95 - allipsorde 97 - avoide 98 troncovoide 99 - obovoide 100 - cylindroide 101 fusiforme 102 - arqueo 103 - autres 104. A jus incolore 105 - colore 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : regulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée (11) A saveur neutro 12 - fade 113 - musque 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation faqile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen (20) - court 121. A pédicelle de couleur : verte (22) - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent 129) A pinceau : court 130 - moyen [31] - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 134. A peau fine 1(5) - moyenne 136 - 6paisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse (39) - molle 140 - peu juteuse. Avec pepins - apyrène.

" Calvo 96

```
Désignation : Roussailes M
Emplacement : 4 R 13 A 566.570
```

```
\begin{array}{c} : (1 - 2 - 3) \\ : 4 - 5 - 6 \\ : 7 - 8 - 9 \end{array}
Angle des nervures
Sexe
L1/I.
                                     : (10)-(11)
                                    : 12 - 13 - (14) - (15) - 16
L2/L
Nombre de lobes
                                : 17 - 18 - (19) - (20)
Prof. sinus latéral Sup.
                                   : 21 - 22 - (23) - (24)
Prof. sinus latéral Inf.
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert
                                     : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus lateral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Fond sinus lateral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
                                     : (40) - 41
Dents : forme
                                    : 42 - (43) - (44)
Dents (angle)
                                    : (45) - (46) - 47
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59

Angle des nervures L3 L'3 : (60) - 61 - 62
Angle des nervures L3 L'3
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Lounes 95